



TC Sağlık Bakanlığı

Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
**DİŞ KANAL TEDAVİSİ SONRASINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR**

Doküman Kodu:HHD.YD.003

Yayın Tarihi: 06.10.2017

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:

Sayfa No:Sayfa 1 / 1

Diş Kanal Tedavisi Sonrasında:

1. Amalgam veya kompozit dolgulardan sonra 30-45 gün süresince ağrı kesici ile kesilen, giderek azalan sıcak-soğuk hassasiyeti oluşabilir. Diş özünün (pulpa) çürük temizleme sırasında uygulanan kuvvete verdiği normal bir tepkidir. Dişinize derin ve yaygın (büyük) bir dolgu yapıldı ise dolgu yapıldıktan sonra hemen sonra veya uzun vadede diş özünde (pulpa) iltihap oluşabilir ve dişinize kanal tedavisi veya çekim uygulanma olasılığı her zaman mevcuttur.

2. Dikkat edilmesi gerekenler: Diş çürüğünün dolgu ile tedavisinden sonra ilk 2 saat(uyuşukluk geçmeden) hiçbir şey yememelidir, sonraki 8 saat dolgu yapılan tarafla yemek yenmemelidir. - Lokal anestezinin geçmesi sonrasında iğnenin girdiği yumuşak doku bölgesinde geçici bir ağrı oluşabilir. -Dolgu yapıldıktan sonra geçecek ilk 24 saat içinde, renklendirici ajanları (salça, çilek, dut, kakaolu ürünler vb.) tüketmekten kaçınılmalıdır. -Hastanın oral hijyen düzeyi kötü (ağız ve diş bakım alışkanlıkları yetersiz) ise eksiklikleri giderici önlemler alınmalıdır. Hastaya tedavinin başarısının uygun ağız bakım alışkanlıklarına bağlı olduğu ifade edilmelidir.

3. Diş çürüğünden korunma: - Dolgu yapılan dişte veya diğer bir dişte yeni diş çürüğü oluşumunu engellemek için dişlerin diş fırçası-floridli diş macunu ve diş ipi ile düzenli bakımı şarttır. Doktorun uyarılarına harfiyen uyulmalıdır.



TC Sağlık Bakanlığı

Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
**DİŞ KANAL TEDAVİSİ SONRASINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR**

Doküman Kodu:HHD.YD.003

Yayın Tarihi: 06.10.2017

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:

Sayfa No:Sayfa 1 / 1

Diş Kanal Tedavisi Sonrasında:

1. Amalgam veya kompozit dolgulardan sonra 30-45 gün süresince ağrı kesici ile kesilen, giderek azalan sıcak-soğuk hassasiyeti oluşabilir. Diş özünün (pulpa) çürük temizleme sırasında uygulanan kuvvete verdiği normal bir tepkidir. Dişinize derin ve yaygın (büyük) bir dolgu yapıldı ise dolgu yapıldıktan sonra hemen sonra veya uzun vadede diş özünde (pulpa) iltihap oluşabilir ve dişinize kanal tedavisi veya çekim uygulanma olasılığı her zaman mevcuttur.

2. Dikkat edilmesi gerekenler: Diş çürüğünün dolgu ile tedavisinden sonra ilk 2 saat(uyuşukluk geçmeden) hiçbir şey yememelidir, sonraki 8 saat dolgu yapılan tarafla yemek yenmemelidir. - Lokal anestezinin geçmesi sonrasında iğnenin girdiği yumuşak doku bölgesinde geçici bir ağrı oluşabilir. -Dolgu yapıldıktan sonra geçecek ilk 24 saat içinde, renklendirici ajanları (salça, çilek, dut, kakaolu ürünler vb.) tüketmekten kaçınılmalıdır. -Hastanın oral hijyen düzeyi kötü (ağız ve diş bakım alışkanlıkları yetersiz) ise eksiklikleri giderici önlemler alınmalıdır. Hastaya tedavinin başarısının uygun ağız bakım alışkanlıklarına bağlı olduğu ifade edilmelidir.

3. Diş çürüğünden korunma: - Dolgu yapılan dişte veya diğer bir dişte yeni diş çürüğü oluşumunu engellemek için dişlerin diş fırçası-floridli diş macunu ve diş ipi ile düzenli bakımı şarttır. Doktorun uyarılarına harfiyen uyulmalıdır.